

GAEC L'AUTRE CHEMIN

Séverine COUGNAUD



Caractéristiques générales de la ferme

Historique :

Anciennement élevage bovin allaitant (Blonde d'Aquitaine)

- 2016 : cultures certifiées AB
- 2020 : installation et conversion de la ferme en production laitière
- 2021 : premier vêlage

Main d'œuvre : 3 associés + 2 salariés = 4.18 ETP + 1 apprenti

SAU : 320 ha (200 ha cultures, 120 ha prairies naturelles et permanentes), 3 bâtiments sur différentes communes : Chantonay, St Cécile, St Germain

Productions : Céréales, légumes, du lait, de la viande (bœuf, veau)

Représentation du produit de la viande bovine dans le chiffre d'affaires : 15-20%

UGB : 187 UGB dont 36 UGB Valomalebio

Race(s) : Normande, Prim Holstein, Blonde d'Aquitaine

Commercialisation des veaux laitiers :

- Lait : Terra Lacta
- Veaux mâles : Unébio



Objectifs de la ferme au niveau de l'élevage de veaux laitiers

« Dès le départ, nous voulions élever nos veaux sous nourrices pour des raisons de bien-être animal. Nous avons des objectifs différents en fonction du sexe des veaux. Les veaux femelles sont destinés à la reproduction. Les veaux mâles

sont engraisés à l'herbe pour en faire des bœufs et ainsi valoriser nos prairies. Aussi, nous étudions d'autres pistes (projets de recherche etc) pour valoriser au mieux nos veaux laitiers. »



Évolution de la conduite d'élevage bovin






Illustration du parcours des animaux sur la ferme



Si lot de printemps

De la naissance à 4-5 mois : les veaux sont gardés avec leur mère ou nourrice et ont accès à volonté à du foin, mélange (2/3 maïs et 1/3 féverole), argile et sel

Été : pâture au champ avec nourrisseur 2/3 maïs sec et 1/3 féverole, minéraux

Pour le 1^{er} hiver : enrubannage, maïs ensilage, féverole, foin, minéraux

Pour le 2^{ème} été : pâture au champ, ainsi de suite...
Vente des bœufs directement en sortie de pâturage en novembre/ décembre (seuls les plus maigres sont engraisés au bâtiment pour être vendus au printemps).

Si lot d'automne

De la naissance à 4-5 mois : les veaux restent en bâtiment avec leur mère ou nourrice et ont accès à volonté à du foin, mélange (2/3 maïs et 1/3 féverole), argile et sel

Été : pâture au champ avec nourrisseur 2/3 maïs sec et 1/3 féverole, minéraux

Pour le 2^{ème} hiver : enrubannage, maïs ensilage, féverole, foin, minéraux

Pour le 2^{ème} été : pâture au champ, ainsi de suite...
Vente des bœufs directement en sortie de pâturage en novembre/ décembre (seuls les plus maigres sont engraisés au bâtiment pour être vendus au printemps).



Informations techniques

	Printemps 23 N = 11	Ecart-type
Durée allaitement (j)	120	15
Poids au sevrage (kg)	190	30
GMQ Naissance - sevrage (g/j)	1160	150

Adoption

La nourrice est choisie en fonction de sa docilité, si elle est boîteuse ou avec un trop grand nombre de cellule pour la traite. Si l'adoption est plus compliquée, on place la vache au cornadis, les veaux à ses côtés, et je passe du temps à les caresser pour tenter de les apaiser et de les habituer à leur présence.

Perte

Moins de perte depuis le début de notre installation : on a gagné en réactivité (observation plus précise et décision plus rapide). Toux : dizaine de veaux / an.

Conduite sanitaire

Prévention : veaux sous nourrice, mise à la pâture dès que possible, argile. Pas d'interventions si absence de maladies. Veaux : antiparasitaire à 1 an au retour de la pâture. VL : antiparasitaire au tarissement.

Castration et écornage

Castration à l'élastique.
Écornage au brûleur.



Les phases clés pour la conduite d'un lot

Naissance : le veau reste entre 1 et 4 jours avec sa mère suivant l'organisation des autres mères nourrices.

Adoption : Une fois le veau adopté par une mère nourrice, il reste avec elle dans la même case jusqu'à environ 1 mois (en fonction de problèmes de concurrence avec les autres veaux). Ensuite, le veau rejoint la case collective des veaux, et retrouve sa nourrice 2 fois par jour.



Les points de vigilance

- L'adoption est un gain de temps si cela se passe bien, mais requiert de la vigilance la première semaine pour que la mère et le veau s'habituent.
- La race Normande ne perd pas l'habitude de téter. Les génisses portent donc une boucle dans le nez pour les empêcher de téter (risque de perte de trayon).



Contact

CAB | Anne UZUREAU
cab productions@biopaysdelaloire.fr
06 24 53 79 69

www.biopaysdelaloire.fr

